

Sam 18/07/2020 en forêt de Montmorency Chauvry



Sam 18/07/2020 en forêt de Montmorency Chauvry



Sam 18/07/2020 en forêt de Montmorency (Chauvry)
Liste des Champignons Aphylophorales

- **LENZITES betulina** : *Lenzite du Bouleau*
- **POLYPORUS ciliatus** (= *P. lepideus*) : *Polypore cilié*
- **TRAMETES hirsuta** : *Trametes hirsute* (vu dernière fois le 15 Février 2020)
- **TRAMETES multicolor** (=ochracea) : *Tramète zonée* (vu dernière fois le 15 Février 2020)

Polyporus ciliatus (= Polyporus lepideus)
Polypore cilié



Pousse sur du bois,
possède des pores
minuscules. SIC

Lenzites betulina

Lenzite du Bouleau

- Bien que classé parmi les Aphylophorales (A privatif : sans, Phyllum : feuillet, lames, phoro : je porte. Je ne porte pas de lames !) le Lenzite du bouleau possède à l'évidence des lames. Sur divers Feuillus



Sam 18/07/2020 en forêt de Montmorency (Chauvry)
1 Boletale : Boletus erythropus



Le Bolet à pied rouge est un bon comestible à condition de bien le connaître et de le faire bien cuire, il peut être un peu toxique à l'état cru.

Chapeau : 5-20cm, sec, velouté brun chocolat à brun noirâtre parfois avec des tons olivâtres.

Tubes : jaunes fortement bleuissants

Pores : fins rouge orangé très bleuissants

Pied : jaune vif mais entièrement recouvert de fines ponctuations rouges

Chair : jaune vif très bleuissante

Saveur douce, Odeur faible.

Habitat : s/Feuillus & Conifères

Liste des Champignons Ascomycetes



Je n'avais vu que des morceaux de bois teintés de bleu étant donné la sécheresse
Mais voici ce que vous pourriez trouver par temps humide.

Liste des Champignons à Lamelles

- *Amanita rubescens* : Amanita rougissante, Golmotte
- *Amanita virosa* : Amanite vireuse
- *Cantharellus cibarius* : Girolle
- *Russula betularum* : Russule émétique des Bouleaux
- *Russula fageticola* (= *Russula mairei*)
- *Russula vesca* : Russula vieux rose, Russule comestible
- *Oudemansiella* (= *Xerula*) *radicata* : Collybie radicante

Amanita rubescens

Amanite rougissante, Golmotte



Chapeau: 4-14cm crème, brun, ochracé
Ou jaune olivâtre ± envahi de rouge vineux avec des restes de voile grisâtres sous forme de plaques ou de verrues.

Lames : libres, blanches puis tâchées de brun rougeâtre.

Pied : blanchâtre puis envahi de brun rouge surtout à la base. Anneau membraneux. Base avec un bulbe en oignon.

Chair : blanche vite piquetée de rougeâtre



Saveur douce de radis,
Odeur faible.

Habitat sous Conifères et sous Feuillus.

L'Amanite rougissante est un bon Comestible mais elle est TOXIQUE à l'état cru ou mal cuit. Il est impératif de bien Cuire & de jeter l'eau de cuisson (Guides Ch. De GE/PR)

Amanita virosa Amanite vireuse



Amanita virosa (26/07/09)
70 Hte Saône (Combeaufontaine)

Chapeau 2,5x12 cm, lisse, forme irrégulière tronconique ou mamelonné blanc à ivoire à centre un peu ochracé en vieillissant.

Lames : libres, blanches

Pied : blanc, pelucheux avec des mèches retroussées. Anneau blanc, fragile. Base bulbeuse recouverte par une Volve en sac ample.

Chair blanche

Saveur & Odeur faible

Habitat : sous Résineux ou sous Feuillus

MORTELL !

Cantharellus cibarius : Girolle jaunotte



Chapeau : 3-10cm jaune vif, uniforme,
Plis : décurrents fourchus concolore au chapeau ou un peu plus pâle,
Pied : 2-7 x 0,5-1,5 cm concolore
Chair blanche ou jaune
Saveur douce, Odeur forte, agréable fruité, d'abricot
Habitat : surtout s/Feuillus

BON COMESTIBLE !

Russula betularum

Russule émétique des Bouleaux



Chapeau rose pastel avec des décolorations blanchâtres, Cuticule entièrement séparable
Chair fragile, blanche
Lames blanches
Pied blanc avec des reflets grisâtres
Saveur piquante, Odeur de « coco »
Habitat : s/Bouleau

Russula silvestris a les mêmes caractéristiques
Mais on les trouve sous Chênes ou Châtaigniers

SIC

Russula fageticola (= Russula mairei) Russule émétique des Hêtres



Chapeau rouge décolorant en crème-ochracé
Cuticule difficile à peler
Lames blanches souvent à reflets bleutés
Pied blanc jaunissant dans la vieillesse
Chair blanche mais rose sous la cuticule
Habitat : bois de Feuillus surtout s/Hêtres (Fagus)

SIC

Russula vesca

Russule vieux-rose, Russule comestible



Chapeau : 5-12 cm brun-rose, rose jambon, souvent crème au centre et piqueté de rouille
Lames : assez serrées blanches à crème débordant du chapeau
Pied : blanc, creux avec l'âge
Chair blanche
Saveur douce. Odeur faible
s/Feuillus en Plaine. S/Conifères en Montagne

BON COMESTIBLE

Oudemansiella radicata (= Xerula radicata) Collybie radicante



Quand la racine est présente,
l'identification se fait sans peine !

Chapeau : 3 – 15 cm visqueux par temps humide,
lisse puis veiné-ridé brun foncé à beige, parfois
totalement blanc.


Lames : adnées à échancrées, espacées, blanches
puis crème.

Pied : 6 – 20 x 0,3 – 2 cm parfois beaucoup plus long
coriace, blanc puis ocre-brunâtre renflé au niveau du
sol et prolongé par une racine ± longue

Chair : blanche

Saveur douce, Odeur faible

SIC



A bientôt pour d'autres
découvertes

MLA (19/07/2020)