



Champignons à lames roses à brunes



Syn : Agaricus romagnesi Agaric radicant

Chap couvert de plaques fibrilleuses brunâtres sur fond pâle Lames libres, gris-rose puis brunes

Pied ± en massue prolongé par une racine dure blanchâtre Anneau blanc peu épais

Chair blanche, jaunissant un peu à la base du pied Saveur douce – Odeur un peu iodoforme

Habitat : le long des chemins, aux orées des bois de Feuillus TOXIQUE

Champignons à lames blanches



Emmanuel découvrant 2 exempl.de l'Amanite phalloïde

#### Amanite phalloïde, Ciguë verte

Chap couleur variable vert olive ou vert jaune, brunâtre, voire crème Lames libres, blanches

Pied blanc, Anneau blanc en jupe. Volve membraneux en sac, blanche Chair blanche. Saveur douce. Odeur faible puis agréable de rose fanée chez les adultes

Habitat : surtout s/Feuillus

**MORTELLE** 



Amanite rougissante, Golmotte
Chap crème brun ochracé jaune olivâtre
Envahi de rouge vineux avec des restes de voile
Sous forme de plaques ou de verrues
Lames libres blanches puis tachées de brun rougeâtre
Pied blanchâtre taché de brun rougeâtre surtout vers la
base. Anneau membraneux, base avec un bulbe en
oignon

Chair blanche piquetée de rouge Saveur de radis, odeur faible Habitat : s/Feuillus & s/Conifères

COMESTIBLE mais **TOXIQUE** crue ou mal cuite

# Champignons à lames crème à lilas



#### Lépiote à crêtes

Chap: couvert d'écailles de couleur variable

de blanchâtre à brun rouge

Lames: libres, blanches puis crème

Pied: blanc puis rosé

Anneau : ample blanc fragile Chair blanchâtre – Saveur douce

Odeur de caoutchouc Habitat : surtout s/Feuillus

TOXIQUE



#### Mycène à lames bordées

Chap : bord strié gris violacé à reflet lilas Lames : adnées à échancrées gris lilas à arête

brun violacé ou pourpre

Pied: concolore au chapeau, un peu en massue

Chair brunâtre puis blanchâtre

Saveur & Odeur de radis

Habitat: s/Feuillus

**TOXIQUE** 

# Champignons à lames décurrentes



#### Clitocybe en entonnoir

Chap vite en entonnoir beige à beige ochracé Lames très décurrentes blanches à crème Pied blanchâtre à crème Chair blanche Saveur douce Odeur rafraîchissante Habitat : s/Feuillus ou s/Conifères SIC



#### Omphale bibelot, Omphale en aiguille

Chap plat puis creusé au centre, strié, jaune orangé Lames très décurrentes blanc grisâtre à orangé pâle Pied crème orangé

Chair jaune orangé à ochracé roussâtre Habitat : dans la mousse des Prés & Forêts

SIC

# Champignons à lames blanches







#### Collybie en touffe

Chap brun, beige puis blanchâtre
Lames: très serrées beige crème à blanchâtre
Pied concolore au chap en haut & brun
rougeâtre en bas nettement velouté
Chair mince
Saveur douce – Odeur d'amande amère
Habitat: en touffes denses en forêt
SIC.

Collybie à pied en fuseau
Chap à large mamelon obtus brun
ochracé vite taché de rouille
Lames épaisses espacées blanchâtre
puis envahies de roussâtre
Pied coriace en fuseau radicant
crème en haut brun roux à la base
Chair blanche Saveur douce
Odeur faible de champignon
Habitat: en touffes s/Souches &
racines de Feuillus
SIC

#### Collybie guêtrée

Chap jaune à brun roussâtre
Lames adnées à échancrées, espacées
brun à jaune ou cannelle
Pied coriace brun jaune à base hérissée
de poils± jaunes
Chair blanche – Saveur piquante
Odeur nette de vinaigre en triturant le
chapeau
Habitat: en forêt s/différents arbres
SIC

# Champignons à lames blanches





#### Collybie radicante et

#### Collybie radicante var marginata

Chapeau visqueux (temps humide) lisse puis veiné-ridé brun foncé à beige, parfois blanc Lames : adnées à échancrées, espacées, blanches puis crème

Arête des lames blanches - brunes dans la var. marginata

Pied 6 – 20 x 0,3 – 2 cm (parfois +) blanc puis ocre brunâtre renflé au niveau du sol et terminé par une longue racine

Chair blanche, saveur douce, odeur faible

Habitat:s/Feuillus

SIC

# Champignons à lames roses







#### Plutée en parasol

Chap: blanc grisâtre à mèches brunâtres au

centre

Lames: libres blanches puis roses

Pied crème avec des fibrilles brunes vers la base

Chair blanche – Saveur douce

Odeur ± de radis

Habitat : s/Bois mort ou sur la sciure de Feuillus

SIC

#### Plutée veloutée

Chap : velouté brun châtain Plus sombre au centre

Lames: libres blanches puis roses

Pied blanc

Chair blanchâtre

Saveur douce - Odeur faible

Habitat : au sol ou s/Bois de Feuillus

SIC

#### Entolome ...

Chap : creusé au centre gris À gris brun souvent à zones

Concentriques

Lames : décurrentes grisâtres

puis rosâtres

Pied: concolore au chapeau

Chair grisâtre

Saveur & Odeur de farine

Habitat: s/sol nu, Pelouses &

Prairies SIC

# Champignons à lames brunes





#### Inocybe de Godey

Chapeau : mamelonné fibrilleux blanc vite taché d'ochracé ou de rose saumon

Lames : échancrées, assez serrées blanchâtre

puis beige brunâtre à gris brunâtre

Pied : pruineux blanc puis rose saumoné à

bulbe marginé à la base

Chair: blanchâtre – Saveur douce

Odeur faible ou spermatique Habitat : s/Feuillus

TOXIQUE

#### Inocybe à pied blanc

Chapeau : ± mamelonné lisse puis fibrilleux

Ochracé jaunâtre à brun jaunâtre

Lames : échancrées blanches puis gris pâle à brun gris Pied pruineux avec un bulbe marginé net, blanc puis ochracé

Chair: blanche – Saveur douce – Odeur spermatique

Habitat : surtout s/Feuillus

TOXIQUE

# Champignons présentant un lait à la cassure





#### Lactaire muqueux

Chap: visqueux, crème, centre

Grisâtre vite creusé

Lames: blanches puis beige ochracé

Pied : crème ochracé Chair blanchâtre

Lait blanc puis gris verdâtre Saveur piquante – Odeur nulle Habitat : uniquement s/Hêtres

SIC

#### Lactaire trompeur

Chap: ocre rougeâtre à beige carné

Lames : crème rosâtre Pied : subconcolore

Chair blanchâtre à subconcolore Lait peu abondant jaunissant Saveur âcre – Odeur pélargonium Habitat: s./divers Feuillus & Conif

SIC



#### Lactaire zonée

Chap : crème à brun orangé zoné Lames : plutôt serrées blanchâtres à

crème pâle

Pied : crème, parfois avec des fossetes

plus sombres

Chair: blanchâtre, rose grisâtre à la

coupe

Lait assez abondant blanc immuable Saveur très piquante – odeur résineuse

Habitat : s/Chênes

SIC

# Champignons à chair cassante







# pi de Russifa vesca

#### Russule anthracite

Chap: gris fuligineux, à noirâtre
Lames assez serrées, crème puis noircissantes
Pied blanc puis gris à noirâtre
Chair blanche, grisonnante puis noircissante
Saveur piquante dans les lames – Odeur faible
Habitat: s/Feuillus
SIC

#### Russule hémétique Des Hêtres

Chap: rouge décolorant en crème Lames blanches Pied blanc puis gris pâle Chair blanche, rose s/cuticule Saveur piquante – Odeur fruité Habitat: s/Feuillus srt Hêtres SIC

#### Russule charbonnière

Chap: couleur variable violet mêlé
De bleu, rose, verdâtre
Lames serrées, nettement
lardacées, blanches
Pied blanc parfois lavé de rose
Chair: blanche ferme
Saveur douce – Odeur nulle
Habitat: s/Feuillus & Conifères
COMESTIBLE

#### Russule vieux rose, Russule comestible

Chap : brun-rose, svt piqueté de rouille
Lames assez serrées blanches à crème un peu lardacées
Pied blanc, creux avec l'âge
Chair blanche – Saveur douce
Odeur faible
Habitat : s/Feuillus en plaine
s/Conifères en montagne
COMESTIBLE

### Champignons à tubes







#### Bolet à pied rouge

Chap: velouté, sombre
Brun chocolat, brun châtain`
Tubes jaunes à jaune olivâtre
Très bleuissants
Pied jaune vif recouvert de fines
Ponctuations rouge vif
Chair: jaune vif très bleuissante
Saveur douce – Odeur faible

Habitat : s/Feuillus & s/Conif

COMESTIBLE

#### Bolet de Quélet

Chap : brun orangé à brun cuivré Tubes : jaunes puis jaune olivâtre

**Nettement bleuissants** 

Pores jaunes puis orangés enfin

rouges bleuissants

Pied : jaune clair, jaune orangé « betterave » dans la base du pied

Chair: idem

Saveur douce – Odeur faible Habitat : uniquement s/Feuillus

SIC

#### Bolet amer, Bolet de fiel

Chap : brun à beige ochracé Tubes : blancs puis ochracés Pores : blancs puis roses

Pied : souvent en massue crème puis beige Avec un réseau brun formé de grosses mailles

En reliefchair : blanche à ocre grisâtre

Saveur fortement amère Odeur agréable de Cèpe Habitat : surtout s/Conifères

Confusion possible avec des Cèpes de Bordeaux ou

des Cèpes d'été à l'état jeune

SIC -

# Champignons à tubes









#### Bolet rude des Charmes

Chapeau: un peu gras au toucher, cabossé ou craquelé beige ochracé à brun noirâtre
Tubes & Pores gris à gris brun
Pied sale, blanc grisâtre couvert de mèches noirâtres
Chair blanchâtre puis violet noirâtre – Saveur douce
Odeur faible
Habiat: surtout s/Charmes
SIC

#### Bolet bai

Chapeau : feutré brun-bai à brun noirâtretubes & Pores blanchâtres puis jaune olivâtre très bleuissants Pied cylind ou presque lisse brun ochracé à roussâtre Chair blanchâtre bleuissant un peu Saveur douce – Odeur faible de Cèpe Habitat : surtout s/Pins COMESTIBLE

#### Bolet à chair jaune

Chapeau: sec, couleur très variable brun ou gris jaune se craquelant vite
Tubes & Pores jaunes à vert olivâtre
Pied vineux rougeâtre, jaunâtre au sommet
Chair jaunâtre dans le cha^, rougeâtre s/cuticule, vineux rougeâtre dans le pied
Saveur douce – Odeur faiible
Habitat: srt s/Conif, s/Hêtres
SIC

#### **Bolet tomenteux**

Chapeau: feutré, très variable de Rouge sang à jaune citron vif Tubes & Pores jaune vif à jaune olivâtre terne ± bleuissants Pied lisse ou avec des veines en relief jaune, mycelium blanc Chair jaune pâle ou blanchâtre rosée ou rougeâtre dans la moitié basse du pied Saveur douce – Odeur faiible Habitat:s/différents Feuillus SIC

# **Champignons Ascomycetes**



#### Helvelle élastique

Chapeau en selle 2/3 lobes irréguliers ochracé jaunâtre À surface inférieur plus pâle Stipe (pied) creux, lisse parfois comprimé blanc Chair mince, blanchâtre Habitat : s/Feuillus, bord de chemins SIC



#### Pas de nom français

Cupule de 2 – 3 cm sessile à hymenium blanc nacré Face externe couverte de poild roux Chair pâle

Habitat : A terre, Bois humides ou Débris végétaux SIC

# **Champignons Nidulariales**



Cyathe strié

#### **Cyathus striatus**

Cyathus = coupe, vase

striatus = strié

Basidiome en coupe profonde de 5 – 15 x 6 – 8 mm

Face externe strigueuse, poilue, de couleur brun tabac

Face interne striée verticalement, brun cendrée

Epifragme (opercule) membraneux, blanc, persistant

Péridioles lenticulaires (15 à 20) de 1,5 − 2 mm Ø grises, brillantes, avec Funicule

Epoque & Habitat : régulièrement en milieu humide ou pluvieuse

Sur Bois en décomposition ou Débris ligneux

# Sam 17 Juillet 2021 à la Piscine de St-Germain Myxomycetes



Très fins petits rameaux blancs Ou jaune vif d'env 5 mm de hauteur Très fragiles Saveur & Odeur sans particularité Habitat: sur bois mort SIC

# Bonne semaine à tous!

