

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)



Ven 4/09/2020
La Roche-Guyon (95)

ph D. Emile

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)



Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)



petite partie de la récolte du 4/09/2020 à la Roche-Guyon (95)

ph mla

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)

Liste des Champignons Aphylophorales

BJERKANDERA adusta : Tramète brûlée, Polypore brûlé

DAEDALEA quercina : *Lenzite du chêne, Dédalée du chêne*

HYMENOCHAETE rubiginosa : *Hymenochaete ...*

TRAMETES multicolor (=ochracea) = *Tramète zonée*

***LAETIPORUS sulphureus* : Polypore soufré (déjà vu en Août)**

***POLYPORUS ciliatus* (= *lepideus*) : Polypore cilié (déjà vu en Juillet)**

1 Gastérale : SCLERODERMA verrucosum (pseudostipe épais à rhizoïdes) -Scléroderme verruqueux


1 Nidulariale : Cyathus striatus : *Cyathe strié, Nid d'oiseau*

1 *Ascomycete* : BULGARIA inquinans : *Bulgarie salissante*

Aphylophorales



Gasterale & Nidulariale




C'est une Vesse-de-loup dont le pied est très développé
Formé par la réunion de cordons mycéliens blancs.

TOXIQUE



C'est un minuscule « nid-d'oiseau » caché dans
Les débris végétaux. La partie externe est hérissée
de longs poils bruns hirsutes. La face interne est
striée cannelée d'où son nom Cyathe strié.

Ascomycete



En disque épais puis en « toupie » gélatineux à face supérieure lisse. Brillante puis mate
En séchant *tachant les doigts au toucher (typique pour reconnaître ce champignon)*.
Face inférieure feutrée, brun-roux à brun noirâtre.
Pied absent ou très réduit
Habitat : s/Ecorce de bois de Feuillus
SIC

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95) Boletales (Comestibles)



Cèpe bronzé

Comme son nom l'indique son chapeau brun sombre
À brun noir est caractéristique
Tubes & pores blancs puis jaune verdâtre
Pied beige à fauve brunâtre avec un réseau peu
discernable
Chair blanche Saveur douce Odeur agréable
Habitat : sous Feuillus
Très bon comestible



Cèpe d'été

Encore une belle espèce brun clair à brun roussâtre
Tubes & Pores blancs puis jaune olivâtre
Pied beige avec un net réseau blanc
Chair blanche
Saveur douce, Odeur agréable
Habitat : sous Feuillus
Bon comestible

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95) Boletales (Comestibles)



Boletus edulis Cèpe de Bordeaux

Cèpe de Bordeaux

Chapeau pouvant atteindre 40cm lisse,
un peu gras au toucher, marge claire
Tubes & Pores blancs puis jaune verdâtre
Pied obèse blanc puis ochracé à réseau blanc au sommet
Chair blanche, rose brunâtre sous la cuticule
Saveur douce, Odeur agréable
Habitat : sous Feuillus

Bon comestible



Boletus erythropus
ph mlb

Bolet à pied rouge

Chapeau sec, velouté brun chocolat à brun châtain
noirâtre parfois un peu olivâtre
Tubes jaunes à jaune olivâtre fortement bleuissants
Pores rouge orangé très bleuissants
Pied jaune vif recouvert de ponctuations rouges
Chair jaune vif très bleuissante
Saveur douce, Odeur faible
Habitat : s/Feuillus & s/Conifères

Bon comestible

Attention : TOXIQUE, mal cuit !

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)

Boletales TOXIQUES



Bolet Satan

Chapeau pâle, Pied jaune en haut, rose vif en bas,
Tubes jaunes puis olivâtres,
Pores jaunes puis rouge sang bleuissants
Chair blanchâtre ou jaunâtre faiblement bleuissante
Saveur douce, Odeur désagréable de viande avariée
Sous Feuillus, sur sol calcaire

TOXIQUE



Bolet blafard

Chapeau ochracé-rosâtre, parfois plus rouge
Tubes & Pores jaunes puis rouge-orangé bleuissants
Pied jaune orangé avec un réseau rougeâtre
Chair blanche à jaunâtre avec une ligne rouge au
dessus des tubes
Saveur : douce, Odeur faible
Sous Feuillus
Comestibilité douteuse (certains le donnent bon
Mais il y a eu quelques cas d'intoxication.
Donc : MEFIANCE !

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)
Boletales : Sans Intérêt culinaire (SIC)



Bolet de Quelet

Chap : velouté, couleur variable brun, orangé, brun rouge
Tubes jaunes, Pores jaunes puis orangés à rouge bleuissants
Pied jaune clair à orangé à base betterave
Chair jaune, betterave à la base du pied, bleuissante
Saveur douce, Odeur faible
Habitat : sous Feuillus sur sol plutôt calcaire
SIC



Bolet radican, Bolet blanchâtre

Chap : hémisph, blanc terne à grisâtre
Pores jaunes ± bleuissants
Pied obèse, ventru à base atténuée radicante
Chair pâle bleuissante
Saveur nettement amère
Habitat : sous Feuillus
SIC

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)

Boletales : Leccinum



Bolet craquelé, Bolet rude à pied jaune-safran

Chapeau brun jaune à fauve orangé un peu cabossé puis craquelé

Pores jaunes

Pied fusiforme un peu atténué à squames pâles ±jaunâtres

Chair rosissante puis grisonnante

Habitat : sous Feuillus

SIC

Bolet rude

Chapeau brun tabac parfois brun noir

Tubes & Pores blanchâtres puis bris brun

Pied couvert de mèches grises puis brunes à noirâtres

Chair blanchâtre à un peu roussissante

Saveur douce, Odeur faible

Habitat : sous Bouleau

Comestible

Ven 4/09/2020 à La Roche-Guyon (95)

Boletales : Suillus & Xerocomus



Ces bolets sont
De comestibilité
Médiocre ou sans
Intérêt culinaire



Liste des Champignons à Lamelles déjà vu en Juillet/Août



Clitocybe en entonnoir
Psathyrelle de De Candolle
Amanite rougissante, Golmotte
Collybie à pied en fuseau
Russule hémétique des Hêtre



Champignons à Lamelles comestibles



Meunier, Clitopile petite-prune

Lames très décurrentes blanches puis roses

Saveur & Odeur très forte de farine mouillée

Hab : s/Conifères & s/Feuillus

Attention : ce bon champignon peut être confondu

Avec les clitocybes blancs TOXIQUES !



Coulemelle, Lépiote élevée, Baguette-de-Tambour

Ce champignon comestible est difficile à confondre.

Sa grande taille, son pied chiné, sa collerette coulissante sont

De bons critères de détermination.

On consomme le chapeau & la collerette, le pied est trop coriace

Champignon à Lamelles comestible mais fortement déconseillé



Pholiotte changeante

Chapeau très hygrophane, brun cannelle se desséchant

En cocarde jaune ochracé

Lames adnées crème puis beige et enfin brunes

Pied crème roussâtre plus sombre vers la base couvert

Par une armille à petites mèches brunes se terminant

par un anneau membraneux

Chair blanche dans le chap. brune dans le pied

Saveur douce, Odeur faible agréable

Habitat : en touffes sur les souches de Feuillus/Conif.

Comestible

Galère marginée

Chapeau lisse, gras au toucher à cuticule débordant sur les lames

Brun orangé à ochracé

Lames adnées, crème puis ochracées

Pied ochracé sous un anneau membraneux

Chair ochracée. Saveur douce. Odeur faible, farineuse

Habitat : svt en colonies s/Bois mort, ou au sol, s/débris ligneux

MORTELLE !



Champignons à lames blanches



Amanite panthère

Chapeau brun couvert de flocons blancs disparaissant facilement (pluie)

Lames libres, blanches

Pied blanc à anneau blanc, base avec un bulbe séparé du pied par un bourrelet net et surmonté par 1 ou 2 autres bourrelets

Chair blanche, Saveur douce, Odeur faible

Habitat : surtout s/Feuillus

TOXIQUE



Marasme de Bulliard

Chapeau strié-cannelé beige à blanchâtre

Lames insérées sur un pseudo-collarium accolées au pied

Pied en forme de crin beige à noir

Chair blanchâtre

Saveur douce, Odeur faible

Habitat : surtout sur Feuilles de Chêne ou d'autres Feuillus
SIC

Champignons à Lames brunes à maturité



Agaric des trottoirs
Lames roses puis noires
SIC



Coprin plissé, Coprin parasol
Lames blanches puis noires SIC



Gymnopile pénétrant
Lames jaune citron puis rouille
TOXIQUE

Psathyrelle veloutée
Lames grises puis brun noir
SIC



Paxille enroulé
Lames jaune ochracé roussissant
MORTEL

Lactaires & Russule



Lactaire fuligineux SIC

Lactaires et Russules ont une chair non filamenteuse,
le pied casse comme un bâton de craie.
Les Lactaires exsudent un lait coloré ou non à la cassure



Lactaire zoné SIC



Russule à odeur spermatique SIC



A bientôt pour d'autres
découvertes

MLA 7/09/2020)